



NEPIECIEŠAMA TŪLĪTĒJA PALĪDZĪBA



IEDZIMTĀ ANGIOEDĒMA (IAE): IAE ir reta un potenciāli dzīvību apdraudoša slimība, ko izraisa **C1 inhibitora deficīts**. Tās biežākās izpausmes ir audu pietūkums (edēma), kas lokalizējas ekstremitātēs (rokās, kājās), vēderā, uz sejas un kakla, un balsenes. Papildus informācija par šo slimību ir pieejama saitē www.haei.org

ELPCEĻU OBSTRUKCIJA: Pie izteiktas elpceļu obstrukcijas pastāv **nosmakšanas risks**. Balsenes, sejas un kakla edēma ir **joti nopietnas**, tās uzreiz ir jāārstē. Ja pastāv elpceļu obstrukcijas risks, **pieredzējušam ārstam ir jāveic pacienta intubācija**. Papildus tam, nepieciešamības gadījumā ir jābūt iespējai veikt neatliekamu traheotomiju.

NEATLIEKAMĀ TERAPIJA: Ātra ārstēšana mazina tūsku lēkmi un samazina slimības biežumu un tās izraisīto mirstību.

IETEICAMĀ TERAPIJA: Ja nav pieejama IAE specifiskā terapija (C1-INH, ecallantide, icatibant), izmantojiet plazmu, kas apstrādāta ar vīrusu inaktivējošām vielām. Ja tāda nav pieejama, lēkmes ir jāārstē ar saldētu plazmu (ja ir pieejama pārbaudīta plazma). IAE lēkmes nereaģē uz terapiju ar glikokortikoidiem, antihistamīniem vai epinefrīnu.

© HAE. Information correct at July 2017



ŠIM PACIENTAM IR IAE

iedzimtā Angioedēma Diagnoze: SSK-10- D84.1

Medicīniskā karte



Vārds: Dzimš. diena:
 Tautība: Valodas:
 Personas kods: Alerģijas:
 Asins grupa: Svarts:
 Terapija: Ievietojiet informāciju par saņemto terapiju vai tās neesamību



Dr

Slimnīca

+371



Kontaktpersonas vārds

Kontaktpersonas attiecības

+371